

Hosta 'Tokudama Flavocircularis'
funkia 'Tokudama Flavocircularis'



Średnich rozmiarów odmiana o żółto obrzeżonych liściach, uzyskana w 1987 roku przez Fumio Maekawa. Odmiana podobna do 'Frances Williams' ale jest mniejsza (niższa) i lepiej toleruje słońce. Kępiasta bylina dorastająca do 40 cm wysokości i 1,2 m szerokości. Blaszki liściowe grube, owalne do zaokrąglonych, szerokie, silnie pomarszczone (pikowane) ma całej powierzchni, zaostrome na wierzchołkach, u nasady sercowate, mają do 23 cm długości i do 17 cm szerokości, na środku niebieskozielone do szaroniebieskich, na brzegach obwiedzione szeroką żółtą obwódką, latem zmieniającą barwę na kremową. Obie barwy atrakcyjnie zazębiają się przechodząc jedna w drugą, tworzą interesujący rysunek. Liście mają żebrwane unerwienie. Ogonki liściowe szaroniebieskawe z żółtym obrysem. Kwiaty lejkowate, prawie białe, zebrane w groniaste kwiatostany. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Roślina polecana do sadzenia na glebach żyznych, próchnicznych, umiarkowanie wilgotnych, przepuszczalnych, na stanowiskach półcienistych. Odmiana odporna na mróz, polecana do sadzenia na rabatach oraz uprawy w pojemnikach.

autorzy: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie	odkrywca, hodowca (selekcjoner): Fumio Maekawa, 1987 r.
grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	wielobarwne, pstre lub obrzeżone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec
nasłonecznienie	stanowisko cieniste stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchnicza
walory	ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe roślina okrywowa ogrody orientalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty pojemniki w grupach
strefa	4

autorzy: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;