

Carex oshimensis 'Evergold'

Synonim lac.: *Carex ornithopoda* 'Evergold'

turzyca oszimiska 'Evergold'



(C) fot. VITROFLORA

(c) fot. VITROFLORA VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o.



(C) fot. VITROFLORA

(c) fot. VITROFLORA VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o.



(c) fot. Wojciech Wróblewski WRÓBLEWSCY Gospodarstwo Szkółkarskie



(c) fot. VITROFLORA VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o.

Kępiasta trawa o powolnym wzroście, osiąga 30 cm. Liście jasnożółte z zielonym brzegiem. Kłosa pojawiają się w czerwcu. Dobrze rośnie na stanowiskach półcienistych i słonecznych w umiarkowanie wilgotnym i lekko kwaśnym podłożu. Toleruje każdy rodzaj gleby, poza piaszczystą. Z uwagi na atrakcyjność liści i małe wymagania, ma wszechstronne zastosowanie zarówno w parkach, jak i małych ogrodach, tarasach; stosowana na obwódkach, skalniakach i w strefie bagiennej. Opracowano na podstawie ankiety Konkursu Roślin - Nowości 2008; zgłaszający: Ogrodnictwo Specjalistyczne W.W.Barcikowsky

autor: , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie

grupa roślin

grupa użytkowa

forma

siła wzrostu

pokrój

docelowa wysokość

barwa liści (igieł)

pora kwitnienia

nasłonecznienie

wilgotność

ph podłoża

rodzaj gleby

walory

wprowadzenie do handlu: 1999

byliny

byliny

bylina

roślina wolnorosnąca

kępiasty

od 0,2 m do 0,5 m

wielobarwne, pstre lub obrzeżone jasnozielone

czerwiec

stanowisko półcieniste

stanowisko słoneczne

podłoże umiarkowanie wilgotne

odczyn lekko kwaśny do obojętnego

przeciętna ogrodowa

próchniczna

gliniasta

ozdobne z liści/igieł



zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
ogrody skalne
ogrody wodne i bagienne
rabaty
pojemniki, balkony, tarasy

strefa

6a

autor: , Związek Szkółkarzy Polskich;

