

Acer capillipes
klon hondoński

Synonim pol.: klon cienkoszypułkowy



(C) fot. Gabriel Tomżyński
(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



(C) fot. Gabriel Tomżyński
(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin

Pochodzące z Japonii drzewo średnich rozmiarów, rosnące w naturze do 12 m wysokości. W uprawie osiąga mniejsze rozmiary, do 8-10 m wysokości. Korona szeroka owalna, gęsto ugałęziona. Liście przeważnie 3 klapowe, do 12 cm długości, jesienią przebarwiające się na czerwono. Kwiaty zielonkawe, zebrane w grona długości 6-12 cm. Kora z białymi prążkami. Na młodszych pędach i gałęziach prążki na czerwono-brązowym tle, na pniu i konarach kremowe prążki na zielonym tle. W uprawie wymaga gleb przeciętnych do żyznych i umiarkowanie wilgotnych, stanowisk słonecznych. Polecany do większych ogrodów, terenów zielni miejskich, parków, zadrzewień przy budynkach użyteczności publicznej.

autorzy: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

zasięg geograficzny

Japonia, w górzyste tereny wysp Honsiu i Shikoku

grupa roślin

liściaste

grupa użytkowa

liściaste krzewy

forma

drzewo

siła wzrostu

roślina szybkorosnąca

pokrój

drzewiasty wyprostowany
jajowaty

docelowa wysokość

od 5 m do 10 m

barwa liści (igieł)

ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

pojedyncze
kwiatostan

barwa kwiatów

żółte

pora kwitnienia

maj

owoce

skrzydlaki

pora owocowania

sierpień
wrzesień

nasłonecznienie

stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

ph podłoża

odczyn lekko kwaśny

rodzaj gleby

przeciętna ogrodowa
próchnicza
gliniasta

walory

ciekawy pokrój
ładne jesienne zabarwienie
ozdobna kora

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
drzewo alejowe parkowe

strefa

5b

autorzy: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

