

Clematis 'Hendersonii'

Synonim łac.: *Clematis x diversifolia* 'Hendersonii' Grupa Integrifolia'

powojnik 'Hendersonii'

Grupa Integrifolia



(C) fot. Szczepan Marczyński
(C) fot. Szczepan Marczyński CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa



(C) fot. Szczepan Marczyński
(C) fot. Szczepan Marczyński CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Powojnik bylinowy o wzniesionych, długich pędach, nie czepiających się podpór, lecz wspierających się o nie. Odporna odmiana zaliczana do Grupy Integrifolia, jedna z najstarszych dotychczas uprawianych. Uzyskana w 1835 r. Pędy zimą zamierają do podstawy. Wiosną nowe pędy wyrastają z ziemi, osiągając długość 1,7-3 m. Pozostawione bez podpór płożą się po ziemi. Kwiaty niebieskofioletowe, dzwinkowate, lekko przewijające, z żółtymi pręcikami. Kwitnie bardzo obficie od VI do IX. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych, wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych, zalewanych, zbyt ciężkich, gliniastych oraz zbyt lekkich, piaszczystych. Zalecane stanowisko słoneczne lub półcieniste, lecz jasne. Wczesną wiosną wymaga wycięcia wszystkich obumarłych pędów, tuż przy podstawie i przycięcia żywych pędów na wysokość 5-10 cm od ziemi. W ogrodzie może być sadzona na rabatach bylinowych lub podwiązywana do podpór. Ładnie przeplata się z innymi roślinami. Nadaje się do uprawy przy kamieniach, starych pniach, niedużych drzewach i krzewach. Może być stosowana do pokrywania małych powierzchni.

autor: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

pochodzenie

pierwsza publikacja: T. Moore & G. Jackman 1877 The Clematis as a Garden Flower; odkrywca, hodowca (selekcjoner): J.A. Henderson Wielka Brytania

grupa roślin

pnącza

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

płożący

docelowa wysokość

od 2 m do 3 m

barwa liści (igieł)

jasnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

pojedyncze

barwa kwiatów

fioletowe

pora kwitnienia

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

nasłonecznienie

stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

ph podłoża

odczyn lekko kwaśny do obojętnego

odczyn zasadowy

rodzaj gleby

próchniczna

walory

ozdobne z kwiatów

zastosowanie

ogrody przydomowe

parki

zielen publiczna

roślina okrywowa

rabaty

pojemniki, balkony, tarasy

pnącze na pergole, kraty

nagrody

AM 1965

strefa

4

autor: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

