

***Acer palmatum* 'Inaba-shidare'**

klon palmowy 'Inaba-shidare'

Grupa Dissectum



(C) fot. Bronisław Szmit

(c) fot. Bronisław Szmit SZMIT Szkoła

ładny krzew o pędach szeroko rozłożystych, dorastający do około 2 m wysokości. W młodym wieku bardzo podobny do odmiany 'Garnet', różniący się od niej pokrojem starszych krzewów. Liście mocno powcinane i postrzępione, wiosną purpurowoczerwone, błyszczące. Barwa utrzymuje się długo latem. Wymaga żyznej, przepuszczalnej, równomiernie wilgotnej gleby i osłoniętych stanowisk, słonecznych lub lekko ocienionych. W bardziej cienistych zakątkach liście nie mają intensywnego koloru. Roślina nadaje się do sadzenia nad wodą, na skraju oczek wodnych, stawów, strumieni, a także podwyższonych rabat i kwietników oraz murków, gdzie ładnie i w pełni można wyeksponować jej walory pokrojowe. Przydatna do małych ogrodów i ogrodów japońskich, na działki, także do uprawy w pojemnikach i donicach. Młode egzemplarze na zimę należy osłaniać chochołami ze słomy, juty lub agrowłókniny.

autorzy: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie

odkrywca, hodowca (selekcjoner): Yokohama Nurseries Japonia;
wprowadzenie do handlu: K. Wezelenburg i Synowie Hazerswoude, Holandia

grupa roślin

liściaste

grupa użytkowa

liściaste krzewy

forma

krzew

siła wzrostu

roślina wolnorosnąca

pokrój

krzewiasty rozłożysty
przewisający (płaczący, zwisty)

docelowa wysokość

od 1 m do 2 m

barwa liści (igieł)

czerwone i purpurowe

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

nasłonecznienie

stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

podłoże wilgotne

ph podłoża

odczyn lekko kwaśny do obojętnego

rodzaj gleby

przeiętna ogrodowa

próchnicza

gliniasta

walory

ciekawy pokrój

ozdobne z liści/igieł

strefa

6

autorzy: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;