

Delphinium 'Astolat' **ostróżka 'Astolat'**

Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.

Niezwykle efektowna, okazała bylina. Odmiana należąca do serii Pacific. Roślina krótkowieczna, często uprawiana jako jednoroczna lub dwuletnia. W okresie kwitnienia osiąga 1,2-1,8 m wysokości. Pędy sztywne, wzniesione, słabo rozgałęzione. Liście tworzą wiosną intensywnie zieloną kępę, o średnicy 0,6-0,8 m. Liście osadzone na długich ogonkach, duże, dłoniaste, 5-7 dzielne, z trójwłóknymi, ostro ząbkowanymi listkami (odcinkami). W czerwcu i lipcu, na szczytach sztywnych, słabo ulistnionych pędów kwiatostanowych, rozwijają się stopniowo, od podstawy kwiatostanu ku górze, okazałe, satynowe kwiaty z ostrogą. Rolę płatków korony pełnią zrosnięte dołem, okrągławe działki kielicha, z których jeden przekształcony jest w charakterystyczną długą ostrogę. Wnętrze kwiatu tworzą zredukowane, kremowobiałe płatki korony, liczne pręciki oraz słupki (2-5). Półpełne, grzbieciste kwiaty mają intensywny łososioworóżowy kolor. Osadzone wzdłuż pędów, na długich szypułkach tworzą strzeliste, wyprostowane grona. Roślina miododajna i owadopylna. Kwiaty zapylane są wyłącznie przez trzmiele, gdyż jedynie długość ich trąbki umożliwia pobieranie nektaru. Rośliny preferują stanowiska osłonięte od wiatru, słoneczne lub lekko ocienione. Najlepiej rosną i kwitną na glebach żyznych, bogatych w próchnicę, głęboko uprawionych, o pH 5,8-7,8. Podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne i przepuszczalne. Gleby suche, piaszczyste i jałowe, a także zalewane w czasie zimy są nieodpowiednie do uprawy ostróżek. Rośliny korzystnie reagują na co 2-3 tygodniowe nawożenie, ściółkowanie podłoża i nawadnianie, zwłaszcza w okresach dłużej utrzymującej się suszy. Odmiana 'Astolat', ze względu na tendencję do pokładania, wymaga instalowania podpór. Przycięcie pędów kwiatostanowych po pierwszym kwitnieniu stymuluje ponowne kwitnienie roślin we wrześniu i październiku. Odmiana dość odporna na mróz, wytrzymuje temperatury do -29 st.C. Ze względu na swoją krótkowieczność wymaga odmładzania co 2-3 lata. Rozmnażana przez wysiew nasion, gdyż w serii Pacific egzemplarze potomne dziedziczą cechy rośliny matecznej. Aby uzyskać nasiona nie ścinamy pędów kwiatostanowych po pierwszym kwitnieniu. Możliwe jest też rozmnażanie przez sadzonkowanie pędów z piętka lub podział roślin. Roślina wymaga ochrony przed ślimakami. By ograniczyć rozwój mączniaka prawdziwego należy zapewnić roślinom odpowiednio dużą przestrzeń. Cała roślina, za wyjątkiem kwiatów, jest lekko trująca. Kontakt z sokiem roślinnym ostróżek może powodować podrażnienia skóry, a spożycie może powodować trudności w oddychaniu, spadek ciśnienia i zatrzymanie pracy serca. Odmiana nadająca się do sadzenia w ogrodach o charakterze naturalistycznym i rustykalnym. Strzeliste kwiatostany wspaniale wyglądają posadzone w grupach, na tle ścian budynków, płotów czy parkanów. Efektownie prezentują się na rabatach, zarówno w wielobarwnych kompozycjach bylinowych, jak też sadzone osobno, w większych skupinach. Wspaniała pionowa roślina strukturalna, do sadzenia pojedynczo w celu wyeksponowania przepięknych, długich, łososioworóżowych kwiatostanów. Nadaje się na kwiat cięty - okazale prezentuje się w wazonach.

autorzy: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzaczasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	łososiowe różowe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	odczyn lekko kwaśny
rodzaj gleby	próchniczna
walory	ciekawy pokrój ozdobne z kwiatów roślina miododajna
zastosowanie	ogrody przydomowe kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty kwiaty cięte w grupach soliter (pojedynczo)

autorzy: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;

