

Geranium phaeum 'Samobor'
bodziszek żałobny 'Samobor'



(C) fot. Gabriel Tomżyński

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



(C) fot. Gabriel Tomżyński

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



Bylina tworząca kępy o wysokości do 80 cm. Liście zielone, głęboko powcinane, czarnoczerwono cętkowane, jesienią przebarwiają się na żółto. Kwiaty duże, koloru czerwonego wina, z odgiętymi płatkami, zebrane po 2 na długich szypułkach. Kwitnie od wczesnej wiosny do początku lata. Uwielbia wilgoć i zacienienie, lecz doskonale znosi również okresową suszę. Do stosowania na łące kwietnej i w kompozycjach naturalistycznych, do okrywania większych powierzchni.

autor: Magdalena Szmit, Szkołka SZMIT;

grupa roślin

byliny

grupa użytkowa

byliny

forma

bylina

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

płaskokulisty

docelowa wysokość

od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł)

wielobarwne, pstre lub obrzeżone

rodzaj kwiatów

pojedyncze

barwa kwiatów

bordowe

pora kwitnienia

maj
czerwiec
lipiec

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne
podłoże wilgotne
podłoże podmokłe (bagienne, nadwodne, wodne)
roślina tolerancyjna

ph podłoża

roślina tolerancyjna

rodzaj gleby

roślina tolerancyjna

walory

ciekawy pokrój
ładne jesienne zabarwienie
ozdobne z kwiatów
ozdobne z liści/igieł

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
zielen publiczna
roślina okrywowa
ogrody wodne i bagienne
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
rabaty
w grupach

autor: Magdalena Szmit, Szkołka SZMIT;