

Geranium sanguineum* var. *striatum

Synonim lac.: *Geranium sanguineum* var. *lancastricense*

bodziszek czerwony odm. paskowana



Bylina tworząca rozłożyste kępy o nitkowanych pędach. Pokrój nieco bardziej zwarty niż gatunku. Wyrasta do wys. 25 cm. Ulistnienie przez cały sezon wegetacyjny trwałe. Liście małe, ciemnozielone, jesienią przebarwiają się na czerwono. Kwiaty jasnoróżowe z czerwonymi żyłkami, o intensywniejszej barwie niż gatunek, pojedyncze na długich szypułkach, od V do IX. Małe wymagania glebowe. Preferuje gleby suche lub średnio wilgotne. Do sadzenia w pełnym słońcu lub częściowym cieniu. Nadaje się na rabaty, do ogrodu skalnego i założeń naturalistycznych, okrywania słonecznych skarp. Do sadzenia w wielkich grupach po kilkadziesiąt roślin. Liczba roślin na 1 m²: 10 - 12.

autorzy: Jacek Marcinkowski; APZ, Agencja Promocji Zieleni;

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	płaskokulisty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	różowe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec sierpień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	roślina tolerancyjna
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	roślina tolerancyjna
walory	ciekawy pokrój ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zielen publiczna roślina okrywowa ogrody skalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty w grupach
strefa	5

autor: Magdalena Szmit, Szkołka SZMIT;