

Goniolimon tataricum

Synonim lac.: *Statice tatarica*

zatrwan tatarski

Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.

Bylina występująca w południowo-wschodniej Europie, o płaskiej rozecie jajowato-lancetowatych liści długości 10-15 cm. Latem (VII-VIII) jej ozdobę stanowią charakterystyczne, wiechowate kwiatostany z prawie białymi kwiatami, osadzone na rozgałęzionych pędach – w okresie kwitnienia roślina osiąga wysokość 30-45 cm. Wymaga przepuszczalnych gleb i słonecznych, a zarazem przewiewnych stanowisk. Stojące powietrze i zbyt mokre, źle zdrenowane podłoże sprzyjają chorobom grzybowym tej byliny, z których najgroźniejszy jest mączniak rzekomy, powodujący zamieranie roślin. Nadaje się do ogrodów skalnych i na rabaty, ale przede wszystkim jest źródłem materiału na suche bukiety.

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	białe
pora kwitnienia	lipiec sierpień
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe rabaty kwiaty cięte suche bukiety
strefa	4

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

