

***Pyrus communis* 'Konferencja'**  
**grusza 'Konferencja'**



(c) fot. Gabriel Tomżyński  
(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński  
(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Odmiana deserowa, najpopularniejsza w Europie. Odporna na parcha. W okres owocowania wchodzi w 3-4 roku po posadzeniu. Owocuje bardzo obficie i corocznie. Niezbędne jest przerzedanie zawiązków. Owoce średniej wielkości, 100-160 g, o zielonej skórce. Miąższ żółtawobiały, delikatny, bardzo słodki, smaczny. Zbiór: druga połowa IX. Małe wymagania glebowe. Najlepsza do małych ogrodów - można szczepić na karłowej pigwie S. Zapylnicze: Faworytka, Bera Hardy, Kominówka, General Leclerc.

autorzy: Miłek Boguszewicz; APZ, Agencja Promocji Zieleni;

<b>grupa roślin</b>	owocowe
<b>grupa użytkowa</b>	drzewa owocowe ziarnkowe
<b>forma</b>	drzewo
<b>siła wzrostu</b>	wzrost typowy dla gatunku
<b>pokrój</b>	stożkowy
<b>docelowa wysokość</b>	od 5 m do 10 m
<b>barwa liści (igieł)</b>	jasnozielone
<b>zimozieloność liści (igieł)</b>	liście opadające na zimę
<b>rodzaj kwiatów</b>	pojedyncze
<b>barwa kwiatów</b>	białe
<b>pora kwitnienia</b>	kwiecień
<b>owoce</b>	zielone jadalne
<b>pora owocowania</b>	wrzesień
<b>nasłonecznienie</b>	stanowisko słoneczne
<b>wilgotność</b>	podłoże umiarkowanie wilgotne
<b>ph podłoża</b>	odczyn lekko kwaśny
<b>rodzaj gleby</b>	próchnicza gliniasta
<b>walory</b>	jadalne owoce ozdobne owoce ozdobne z kwiatów
<b>zastosowanie</b>	owoce deserowe owoce na przetwory
<b>strefa</b>	6a

autorzy: Miłek Boguszewicz; , Związek Szkółkarzy Polskich;