

***Rheum palmatum* var. *tanguticum***  
**rabarbar dłoniasty podgatunek. tangucki**

Synonim pol.: rabarbar tangucki



(C) fot. Wiesław Sztydło

(c) fot. Wiesław Sztydło SZYDŁO Wiesław Szkołka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Iglak Niewierz”

Okazała bylina o dużych liściach. Liście w zarysie okrągłosercowate, głęboko dłoniasto klapowane, o klapach spiczastych i głęboko pierzasto wcinanych. Młode liście intensywniej czerwone. Kwiatostany na pędach wysokości do 2 m, wąskie, wiechowate, z żółtobiałymi kwiatami, w V-VI. Owoce ciemnoczerwone. Wymaga obfitego nawożenia i dość wilgotnej gleby. W miejscach jałowych, szczególnie podczas suchego lata, liście zasychają już w VIII. Poleca się dość wcześnie wycinać przekwitające kwiatostany dzięki czemu ulistnienie jest trwalsze. Po 5-6 latach konieczne jest przesadzanie, gdyż słabnie siła wzrostu. Najefektowniej wygląda sadzony w ogrodzie żwirowym. Do sadzenia pojedynczo lub 2-3 w grupie. Liczba roślin na 1 m<sup>2</sup> - 1.

autorzy: Jacek Marcinkowski; APZ, Agencja Promocji Zieleni;

**grupa roślin**

byliny