

Aster novae-angliae 'Rudelsburg'**aster nowoangielski 'Rudelsburg'**

Synonim pol.: marcinki nowoangielskie 'Rudelsburg'

Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.

Wartościowa, bujna bylina rabatowa. Dorasta do 100 cm wysokości. Łodyga mocno ulistniona, kutnerowato owłosiona, na szczycie rozgałęziona, zakończona licznymi koszyczkami kwiatowymi. Liście wąskolancetowate. Koszyczki kwiatowe, zebrane w szczytową baldachokształtną wiechę. Kwiaty języczkowate łososioworóżowe, kwiaty rurkowate żółte. Kwitnie od VIII do IX. Koszyczki w czasie pochmurnej pogody, w nocy i po ścięciu zamykają się. Bylina łatwa w uprawie, całkowicie mrozoodporna. Wymaga stanowisk słonecznych, gleby umiarkowanie wilgotnej, żyznej i zasobnej w wapń. Ze względu na naturalne zasychanie liści od dołu, dobrze wygląda sadzona z tyłu rabaty, najlepiej w towarzystwie innych bylin o bardziej trwałym ulistnieniu, w małych grupach po 3-10 roślin.

autorzy: Małgorzata Kunka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

| | |
|------------------------------------|--|
| grupa roślin | byliny |
| grupa użytkowa | byliny |
| forma | bylina |
| siła wzrostu | wzrost typowy dla gatunku |
| pokrój | krzaczasty wyprostowany |
| docelowa wysokość | od 0,5 m do 1 m |
| barwa liści (igieł) | ciemnozielone |
| zimozieloność liści (igieł) | liście opadające na zimę |
| rodzaj kwiatów | kwiatostan |
| barwa kwiatów | różowe |
| pora kwitnienia | sierpień wrzesień |
| nasłonecznienie | stanowisko słoneczne |
| wilgotność | podłoże umiarkowanie wilgotne |
| ph podłoża | odczyn zasadowy |
| rodzaj gleby | przeiętna ogrodowa próchniczna gliniasta |
| walory | ozdobne z kwiatów roślina miododajna |
| zastosowanie | ogrody przydomowe rabaty w grupach |
| strefa | 4 |

autorzy: Małgorzata Kunka; , Związek Szkółkarzy Polskich;

