

## **Astilbe 'Amerika'** **tawułka 'Amerika'**

Grupa Arendsii



(C) fot. Gabriel Tomżyński

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



(C) fot. Gabriel Tomżyński

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



Bylina o pierzastych, błyszczących liściach i długich różowych, wiechowatych kwiatostanach (dł. ok. 25 cm). Odmiana wczesna, kwitnąca latem, z Grupy Arendsii. Roślina dorasta do wysokości ponad 70 cm. Wymaga wilgotnego, żyznego podłoża. Polecana na rabaty, do miejsc półcienistych (szczególnie, jeśli gleba jest uboga i łatwo wysycha), najlepiej wygląda sadzona w grupach, także nad wodą. Nadaje się też na obwódki. Można pozyskiwać kwiaty cięte, ale mają one krótką trwałość. Sadzić w rozstawie 60 x 60 cm.

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

<b>grupa roślin</b>	byliny
<b>grupa użytkowa</b>	byliny
<b>forma</b>	bylina
<b>siła wzrostu</b>	wzrost typowy dla gatunku
<b>pokrój</b>	kępiasty
<b>docelowa wysokość</b>	od 0,5 m do 1 m
<b>barwa liści (igieł)</b>	ciemnozielone
<b>rodzaj kwiatów</b>	kwiatostan
<b>barwa kwiatów</b>	różowe
<b>pora kwitnienia</b>	lipiec sierpień
<b>nasłonecznienie</b>	stanowisko półcieniste
<b>wilgotność</b>	podłoże wilgotne
<b>rodzaj gleby</b>	próchnicza
<b>walory</b>	ozdobne z kwiatów
<b>zastosowanie</b>	ogrody przydomowe parki kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty pojemniki kwiaty cięte w grupach
<b>strefa</b>	6

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;