

Astilbe 'Glut'

Synonim lac.: *Astilbe 'Glow'*

tawułka 'Glut'

Grupa Arendsii



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin



(c) fot. Grzegorz Falkowski



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Bylina o pierzastych, czerwonych (zwłaszcza wiosną) liściach oraz wiechowatych kwiatostanach, które w pąkach są ciemnoczerwone, a po rozwinięciu mają barwę intensywnie czerwoną z różowymi refleksami („płoną”). Są wąsko stożkowate i pojawiają się w pełni lata (VII-VIII). Roślina osiąga wysokość ok. 75 cm. Wymaga wilgotnego, żyznego w podłoża. Polecana na rabaty, do miejsc półcienistych (szczególnie, jeśli gleba jest uboga i łatwo wysycha), najlepiej wygląda sadzona w dużych grupach, także nad wodą. Można pozyskiwać kwiaty cięte, ale mają one krótką trwałość.

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie

pierwsza publikacja: 1952; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Georg Arends Niemcy

grupa roślin

byliny

grupa użytkowa

byliny

forma

bylina

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

kępiasty

docelowa wysokość

od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł)

czerwone i purpurowe
ciemnozielone

rodzaj kwiatów

kwiatostan

barwa kwiatów

czerwone

pora kwitnienia

lipiec
sierpień

nasłonecznienie

stanowisko półcieniste

wilgotność

podłoże wilgotne

ph podłoża

odczyn lekko kwaśny

rodzaj gleby

próchnicza

walory

ozdobne z kwiatów
ozdobne z liści/igieł

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
rabaty
kwiaty cięte
w grupach

strefa

6

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;