

Astilbe 'Hyazinth' **tawułka 'Hyazinth'**

Grupa Arendsii



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYNSKI Szkołka Roślin

Bylina o pierzastych liściach oraz wiechowatych lilaróżowych kwiatostanach, które bledną w trakcie rozwoju i stają się prawie białe. Mają zwartą budowę i są liczne. Jest to dość późna odmiana z Grupy Arendsii, która pozwala przedłużyć okres kwitnienia tawulek na koniec lata i wczesną jesień. Rośliny osiągają wysokość ok. 90 cm. Wymagają wilgotnego, żyznego w podłoża. Polecana na rabaty, do miejsc półcienistych (szczególnie, jeśli gleba jest uboga i łatwo wysycha), jako jasny akcent na ciemniejszym tle. Najlepiej wyglądają sadzone w dużych grupach, także nad wodą. Jedna z lepszych odmian tawułki na kwiaty cięte.

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie

pierwsza publikacja: 1920; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Georg Arends Niemcy

grupa roślin

byliny

grupa użytkowa

byliny

forma

bylina

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

kępiasty

docelowa wysokość

od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł)

ciemnozielone

rodzaj kwiatów

kwiatostan

barwa kwiatów

różowe

pora kwitnienia

lipiec
sierpień
wrzesień

nasłonecznienie

stanowisko półcieniste

wilgotność

podłoże wilgotne

ph podłoża

odczyn lekko kwaśny

rodzaj gleby

próchnicza

walory

ozdobne z kwiatów

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
rabaty
kwiaty cięte
w grupach

strefa

6

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;