

**Vinca minor 'Ralph Shugert'**  
**barwinek pospolity 'Ralph Shugert'**



(C) fot. Bronisław Szmit  
(c) fot. Bronisław Szmit SZMIT Szkółka



(C) fot. Bronisław Szmit  
(c) fot. Bronisław Szmit SZMIT Szkółka



Niska, zimozielona, drewniejąca u nasady krzewinka o ściełających się po ziemi pędach i ciemnozielonych liściach obwiedzionych cienką, białą obwódką. Osiąga do 15-20 cm wysokości, ale rozrasta się szeroko na boki. Tworzy dwa rodzaje pędów. Pędy letnie (płonne) są długie, wiotkie, pełzają po powierzchni gruntu i łatwo się zakorzeniają. W ten sposób rośliny szybko się rozrastają i szczelnie zadarniają teren. Na wiosnę z miejsc, w których rośliny się zakorzeniły, wyrastają pionowo wzniesione, krótsze pędy (płodne, mające około 15 cm) zakończone pąkami kwiatowymi. O dekoracyjności tej odmiany decydują głównie pstre, zimozielone liście o jajowatym kształcie, ułożone naprzeciwlegle na pędach, oraz niebieskie kwiaty. Liście mają do 3,5 cm długości, są skórzaste, błyszczące, całobrzegie, zaostrome na wierzchołku, ciemnozielone z charakterystyczną cienką, nieregularną, białą obwódką. Pojedyncze, jasnoniebieskie kwiaty o średnicy do 3 cm wyrastają na długich szypułkach z pachwin górnych liści. Składają się z pięciu płatków skośnie uciętych z przodu, zaś w pąku lewostronnie zachodzących na siebie. Kwiaty przypominają małe wiatraczki. Po zapyleniu i zapłodnieniu tworzą się niepozorne owoce (mieszki) wypełnione nasionami. Kwiaty rozwijają się obficie w kwietniu i maju, jeszcze przed rozwojem nowych liści, ale pojedyncze kwiaty pojawiają się przez całe lato, aż do września. Barwinek pospolity najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchnicznych i świeżych, ale w zasadzie nie jest wybredny, co do gleby. O wiele istotniejszym czynnikiem, wpływającym na jego wzrost i walory dekoracyjne jest nasłonecznienie. Doskonale nadają się do sadzenia w miejscach półcienistych i cienistych. W pełnym słońcu liście mogą być narażone na uszkodzenia, szczególnie w bezśnieżne zimy. Zaletą rośliny jest tolerancja na suszę, pełna mrozoodporność i bujny wzrost. W przeciwieństwie do innych pstrolistnych odmian barwników rośnie zdrowo i silnie. W sprzyjających warunkach krzewinka szybko się rozrasta, zadarniają powierzchnię gleby, przez co uniemożliwiają wzrost chwastów. Roślina polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych oraz zieleni parkowej. Odmiana została wyhodowana w 1986 roku w Stanach Zjednoczonych przez Davida Mc'Kenziego i nazwana na część zaprzyjaźnionego z hodowcą eksperta ogrodniczego Ralpa Shugerta.

autorzy: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

<b>grupa roślin</b>	liściaste
<b>grupa użytkowa</b>	liściaste krzewy
<b>forma</b>	krzewinka
<b>siła wzrostu</b>	wzrost typowy dla gatunku
<b>pokrój</b>	płożący
<b>docelowa wysokość</b>	od 0,1 m do 0,2 m
<b>barwa liści (igieł)</b>	wielobarwne, pstre lub obrzeżone
<b>zimozieloność liści (igieł)</b>	liście zimozielone
<b>rodzaj kwiatów</b>	pojedyncze
<b>barwa kwiatów</b>	niebieskie
<b>pora kwitnienia</b>	kwiecień maj czerwiec
<b>nasłonecznienie</b>	stanowisko cieniste stanowisko półcieniste
<b>wilgotność</b>	podłoże umiarkowanie wilgotne roślina tolerancyjna
<b>ph podłoża</b>	odczyn lekko kwaśny
<b>rodzaj gleby</b>	przeiętna ogrodowa próchniczna gliniasta
<b>walory</b>	ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona

**zastosowanie**

ogrody przydomowe  
parki  
roślina okrywowa  
ogrody skalne  
w grupach

**strefa**

6a

autorzy: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

