

Anemone xhybrida 'Honorine Jobert'

Synonim lac.: *Anemone japonica* var. *alba*

zawilec mieszańcowy 'Honorine Jobert'



(C) fot. VITROFLORA

(c) fot. VITROFLORA VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o.



(C) fot. Grzegorz Falkowski



(c) fot. VITROFLORA VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o.



(c) fot. VITROFLORA VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o.



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin



Przepiękna odmiana mieszańcowa powstała ze skrzyżowania dwóch gatunków pochodzących z Chin: *Anemone hupehensis* var. *japonica* i *Anemone vitifolia*. Odmiana długowieczna, niezawodna i wytrzymała, zdobiąca ogród późnym latem i jesienią. Osiąga wysokość 70-120 cm, a w optymalnych warunkach nawet 150 cm i średnicę 60-90 cm. Rozrasta się przez podziemne rozłogi. Już wczesną wiosną rozwija duże, ciemnozielone, trójdzielne, lekko owłosione, nieregularnie klapowane liście, tworzące efektowną przyziemną rozetę. W sierpniu nad rozetą liści wyrastają sztywne, rozgałęzione góra pędy kwiatostanowe, zakończone kielichowatymi kwiatami, zebranych na wierzchołkach pędów w luźne, wielokwiatowe baldachy. Kwiaty w pąkach różowe, po rozwinięciu śnieżnobiałe, zbudowane z zielonego słupkowieca, otoczonego jaskrawopomarańczowym okółkiem pręcików i podwójnym okółkiem płatków (8-9 listków okwiatu). Kwitnienie trwa ok. 5 tygodni, od sierpnia do października, a w optymalnych warunkach jeszcze dłużej. Najlepsze do uprawy tej odmiany są miejsca osłonięte, wilgotne i półcieniste. Na stanowiskach słonecznych i zacienionych także daje sobie dobrze radę. Rośliny posadzone w cieniu słabiej kwitną, zaś liście i płatki kwiatowe egzemplarzy rosnących w miejscach silnie nasłonecznionych mogą być uszkodzone przez intensywne promieniowanie słoneczne. Preferuje podłoża żyzne, stale umiarkowanie wilgotne, dobrze zdrenowane, bogate w próchnicę. Źle rośnie na glebach ciężkich, zwięzłych, podmokłych, zwłaszcza zimą. Nie znosi dłuższych okresów suszy. Późną jesienią należy przyciąć pędy roślin tuż nad ziemią. Zanim rośliny dobrze się przekorzenia, wskazane jest ściółkowanie podłoża na zimę grubą, na 10-15 cm warstwą ściółki. Starsze rośliny zabezpieczamy lżejszym materiałem np. stroiszem. Odmiana okazała prezentująca się na rabatach w połączeniu z innymi bylinami: odetkami, astrami, ozdobnymi trawami, zwłaszcza w ogrodach nieformalnych, wiejskich i naturalistycznych. Obsypana białymi kwiatami wspaniale rozjaśnia wszystkie ocienione zakątki ogrodów. Doskonale sprawdza się w półcienistych miejscach pod drzewami i wyższymi krzewami, świetnie czuje się w pobliżu zbiorników wodnych oraz pod wschodnimi lub zachodnimi ścianami budynków i parkanów. Roślina tradycyjnie uprawiana w Japonii, toteż dobrze prezentuje się w ogrodach orientalnych zwłaszcza sadzona w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów. Nadaje się na kwiat cięty.

autorzy: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;

grupa roślin

grupa użytkowa

forma

siła wzrostu

pokrój

docelowa wysokość

barwa liści (igieł)

zimozieloność liści (igieł)

rodzaj kwiatów

barwa kwiatów

byliny

byliny

bylina

wzrost typowy dla gatunku

krzaczasty wyprostowany

od 1 m do 2 m

ciemnozielone

liście opadające na zimę

kwiatostan

białe

różowe



pora kwitnienia	sierpień wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchnicza
walory	ciekawy pokrój ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe ogrody orientalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty kwiaty cięte w grupach soliter (pojedynczo)
nagrody	RHS Award of Garden Merit w 1993roku
strefa	5

autorzy: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;

