

Taxus baccata 'Washingtonii'
cis pospolity 'Washingtonii'

Grupa Washington



(C) fot. Lucjan Kurowski

(c) fot. Lucjan Kurowski KUROWSCY Szkołki

Odmiana zaliczana do grupy cisów drzewiastych o dość silnym wzroście. Krzewy mają gałęzie wzniesione do góry, są najszersze w środkowej części. Po 15 latach dorastają do wys. 2 m i osiągają szer. 2-2,5 m. Igły krótkie (zwykle dł. 2-2,5 cm), z szerokimi obrzeżeniami intensywnie żółtej barwy, a wiosną na nowych przyrostach - całkowicie żółte. Jesienią i zimą są bardziej zielone. Odmiana płci żeńskiej, krzewy zawiązują nasiona otoczone osnówkami, które w niektórych latach są dość liczne i stanowią dodatkową ozdobę. W uprawie wymagają gleb przeciętnych lub żyznych, zwięzłych, umiarkowanie wilgotnych, stanowisk lekko ocienionych lub cienistych. Odmiana dobra do kolorystycznych zestawień. Polecana do ogrodów przydomowych, kolekcji roślin iglastych, starych ogrodów i parków, nadaje się na żywopłoty formowane o wys. do 2 m oraz na szerokie szpalery naturalne, niewymagające cięcia.

autorzy: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie	wprowadzenie do handlu: 1864 Wielka Brytania
grupa roślin	iglaste
grupa użytkowa	iglaste
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzaczasty wyprostowany
docelowa wysokość	od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł)	żółte, złociste
zimozieloność liści (igieł)	igły zimozielone
owoce	czerwone ozdobne
nasłonecznienie	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeciętna ogrodowa gliniasta
walory	ciekawy pokrój ozdobne z liści/igieł roślina zimozielona
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna żywopłot rabaty
strefa	5b

autorzy: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;